

化学療法(CHOPのみ)を受けられる患者さまへ クリニカルパス・入院療養計画書

様

<<DYTODAY>>

月日	投与1日目			投与2日目
	化学療法前	化学療法投与中	化学療法投与後	化学療法 翌日
検査	・朝食前に体重測定をおこなってください			・適宜、血液検査をします ・朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては処置が必要になることがあります)
お薬	・5日間のプレドニゾロンの内服が始まります。 ※朝・昼でお薬の数が変わりますので注意して下さい (/ ~ /)   			
治療・処置	・副作用を抑えるための点滴を行います 	・すべての化学療法薬(アドリアシン・オンコビン・エンドキサン)が終了するまで約4時間程度かかります 	・終了後も水分の点滴が続きます 	・水分摂取ができれば点滴は終了です
行動	・制限はありません	・化学療法薬の投与中はできるだけお部屋で過ごすようにしてください	・制限はありません 	・制限はありません 
清潔	・シャワー浴を行う場合は化学療法薬の投与前か投与後に行うようにし、投与中のシャワー浴は避けてください ・点滴は看護師が防水処置を行いますのでシャワー浴の時間を相談してください 			・制限はありません
食事	・パンフレットに沿った食事を心がけて下さい ・病院食や食べ物のことで困ることがあれば、看護師に相談して下さい ・必要にあわせて栄養士が相談に乗ります			・吐き気があったり食欲が落ちたりすることがあります ・体の調子に合わせてお食事をとってください ・病院食で困ることがあれば相談して下さい
説明・指導	・看護師より化学療法についてお話しします ・副作用(発熱・頭痛・かゆみ・吐気・発疹など)の症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい。 ・副作用を抑える点滴をすると眠くなる場合があります。歩行時にはふらつきに注意しましょう。 ・尿が赤くなりますが、お薬(アドリアシン)の影響なので心配ありません。 ・ 化学療法薬が血管の外に漏れた場合には直ちに処置が必要となります。投与中に点滴のまわりや血管が少しでも痛むようであればすぐに知らせして下さい ・手洗い、うがい薬でのうがい、マスクの着用をこころがけ、身のまわりを清潔に整えましょう。 			・手洗い、うがい薬でのうがいをおこない、身のまわりを清潔に整えましょう。 ・お薬の副作用で便秘になることがありますので水分摂取をこころがけてください ・便秘が続く場合には、医師・看護師にご相談ください