



化学療法(HD-MTX)を受けられる患者さまへ クリニカルパス・入院療養計画書

様

<<DYTODAY>>

月日	投与1日目			投与2～5日目	投与6日目以降
	化学療法前	化学療法投与中	化学療法投与後	化学療法 翌日	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 朝食前に体重測定をおこなってください 	<ul style="list-style-type: none"> 尿量を測定して下さい 	<ul style="list-style-type: none"> 尿量を測定して下さい 	<ul style="list-style-type: none"> 適宜、血液検査をします 尿量を測定して下さい 朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては利尿剤の処置が必要になります) 	<ul style="list-style-type: none"> 適宜、血液検査をします 尿量を測定して下さい 朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては利尿剤の処置が必要になります)
治療・処置	<ul style="list-style-type: none"> 本日からバクタの内服は中止です 副作用を抑えるための点滴を行います 利尿剤の内服があります 	<ul style="list-style-type: none"> 化学療法薬(メソトレキセート)を24時間かけて点滴します 利尿剤の内服があります 	<ul style="list-style-type: none"> 終了後も水分の点滴が続きます 利尿剤の内服があります 	<ul style="list-style-type: none"> 化学療法の副作用を中和するお薬(ロイコボリン)の点滴(1日4回)があります 終了後も水分の点滴が続きます 利尿剤の内服があります 	<ul style="list-style-type: none"> 血液検査の結果によっては、以降もロイコボリンの点滴が必要になることがあります バクタの内服が再開の場合は説明します
行動	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません
清潔	化学療法薬(メソトレキセート)投与中のシャワー浴はできるだけ避けてください 			<ul style="list-style-type: none"> メソトレキセート終了後、シャワー浴が可能です 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません
食事	<ul style="list-style-type: none"> パンフレットに沿った食事を心がけて下さい 病院食や食べ物のことで困ることがあれば、看護師に相談して下さい 必要にあわせて栄養士が相談に乗ります 水分をとるように心がけて下さい 			<ul style="list-style-type: none"> 吐き気があったり食欲が落ちたりすることがあります 体の調子に合わせてお食事をとってください 病院食で困ることがあれば相談して下さい 水分をとるように心がけて下さい 	
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 看護師より化学療法についてお話しします 副作用(吐気・嘔吐・口内炎・下痢・頭痛など)の症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい 点滴中、点滴のまわりや血管が痛むことがあればすぐに知らせて下さい ダイアモックス内服中は頻尿になります 抗がん剤を投与当日朝～翌日朝までは尿量を測定し、食事箋に記録してください お薬の投与1週間前後より口内炎ができることがありますので、うがい薬でのうがいを習慣にしてください 				