

R-B(のみ)新投与法を受けられる患者さまへ クリニカルパス・入院療養計画書

様

年 月 日

月日	リツキサン			トレアキシン	
	化学療法前	化学療法投与中	化学療法投与後	化学療法 翌日	
検査	・朝食前に体重測定をおこなってください			・適宜、血液検査をします ・朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては処置が必要になることがあります)	・適宜、血液検査をします ・朝食前に体重測定をおこなってください (体重の値によっては処置が必要になることがあります)
お薬	・リツキサン投与の 30分前にカロナールを内服してください (※ 内服時間 :)				
治療・処置	・副作用を抑えるための点滴を行います	・リツキサンの投与は約4時間程度かかります ・リツキサン投与中は輸液ポンプを使用します	・終了後も水分の点滴が続きます	・トレアキシンのみの化学療法が2日間あります ・終了後も水分の点滴が続きます	・水分摂取ができれば点滴は終了です
行動	・制限はありません	・リツキサン投与中はできるだけお部屋で過ごすようにしてください ・トイレでベッドを離れるときにはポンプの充電ケーブルを抜き、戻ったらすぐに充電を開始してください	・制限はありません	・化学療法薬の投与中はできるだけお部屋で過ごすようにしてください	・制限はありません 
清潔	・シャワー浴を行う場合は化学療法薬の投与前か投与後に行うようにし、投与中のシャワー浴は避けてください ・点滴は看護師が防水処置を行いますのでシャワー浴の時間を相談してください 				・制限はありません 
食事	・パンフレットに沿った食事を心がけて下さい ・病院食や食べ物のことで困ることがあれば、看護師に相談して下さい ・必要にあわせて栄養士が相談に乗ります			・吐き気があったり食欲が落ちたりすることがあります ・体の調子に合わせてお食事を食べてください ・病院食で困ることがあれば相談して下さい 	
説明・指導	・看護師より化学療法についてお話しします ・ リツキサンには発熱・頭痛・悪寒(震え)・かゆみ・発疹・咳や息苦しさ・動悸などの副作用が出る場合があります。副作用は開始直後や、点滴速度を速めた時に起こることがあります。これらの症状があれば、すぐに医師や看護師に知らせて下さい。 ・点滴中、点滴のまわりや血管が痛むことがあればすぐに知らせて下さい。副作用を抑える点滴(プロイメンド)の投与中、血管が痛くなる場合があります。痛みが強ければ知らせて下さい ・副作用を抑える点滴をすると眠くなる場合がありますので、歩行時にはふらつきに注意しましょう。 ・手洗い、うがい薬でのうがい、マスクの着用をおこない、身のまわりを清潔に整えましょう。			・化学療法薬(トレアキシン)が血管の外漏れた場合には、直ちに処置が必要となります ・ トレアキシン投与中に血管に沿った痛みや腫れ(血管炎)が起きることがあります、投与中に痛むようであればすぐに知らせて下さい ・手洗い、うがい薬でのうがい、マスクの着用をおこない、身のまわりを清潔に整えましょう。	