

| 分類 No. | 薬剤/手技                               | 投与量   | day(1) |
|--------|-------------------------------------|-------|--------|
| 注射 1   | 静脈内注射 (リザーバーより)                     |       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付              | 1筒    |        |
|        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) | 1筒    |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)           |       |        |
| 注射 2   | 点滴注射                                |       | ●      |
|        | 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)              | 1瓶    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用         |       |        |
| 注射 3   | 点滴注射                                |       | ●      |
|        | キイトルーダ注<br>(200mg/body)             | 200mg |        |
|        | 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)              | 100mL |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>30分で |       |        |
| 注射 4   | 静脈内注射                               |       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付              | 1筒    |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)<br>フラッシュ用 |       |        |