

レジメン名称：N18-101 Nivolumab biweekly（ホジキンリンパ腫）

休薬期間：14日

| 分類 | No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|----|-----|---|-------|--------|
| 注射 | 1 | 静脈内注射（リザーバーより） | | ● |
| | | 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 | 1筒 | |
| | | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック） | 1筒 | |
| | | ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） | | |
| 注射 | 2 | 点滴注射 | | ● |
| | | 生食注（生理食塩液）100mL（PG） | 1瓶 | |
| | | 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 | | |
| 注射 | 3 | 点滴注射 | | ● |
| | | オプジーボ注 フィルタ （240mg/Body） | 240mg | |
| | | 生理食塩液 PL 50mL | 50mL | |
| | | 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分以上かけて | | |
| 注射 | 4 | 静脈内注射 | | ● |
| | | 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 | 1筒 | |
| | | ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用 | | |