

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用		
注射 3	点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/Body)	200mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30 分で		
注射 4	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射 5	点滴注射		●
	アリムタ注射用 (500mg / m <sup>2</sup> )	500mg / m <sup>2</sup>	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		