

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●
注射	2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キトルーダ）	1瓶	●		
注射	3	点滴注射 キイトルーダ注 (200mg/body) 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で	200mg 100mL	●		
注射	4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で キイトルーダと別（フィルターなし）ルートで。	6.6mg 1袋	●		
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブキ注投与前後フラッシュ用	1瓶	●		
注射	6	点滴注射 アブキ注100mgインラインフィルタ不可【H緑 (100mg/mL) 生理食塩液PL 50mL (1バールあたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL	●		
注射	7	点滴注射 カルボプラチン (AUC=6) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分で	0mg/A 250mL	●		
注射	8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●		
注射	9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●		
注射	10	点滴注射 デキサート注 3.3mg/mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●	●
注射	11	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブキ注投与前後フラッシュ用	1瓶		●	●
注射	12	点滴注射 アブキ注100mgインラインフィルタ不可【H緑 (100mg/mL) 生理食塩液PL 50mL (1バールあたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL		●	●
注射	13	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●	●