

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キイトルーダ）		
注射	3 点滴注射		●
	キイトルーダ注 （200mg/body）	200mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	アリムタ注射用 （500mg/m ² ）	500mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 10分で アリムタ投与後、30分の経過観察不要		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=5）	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で アリムタ投与後、30分の経過観察不要		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	8 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		