

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ハリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ハリンロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射 2	点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（テセントリク）		
注射 3	点滴注射		●
	テセントリク注 1200mg	1200mg	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （1200mg/body）	250mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回60分、認容性良ければ2回目以降30分に短縮可		
注射 4	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
	ボララミン注 5mg/1mL	1A	
	ガスター注 20mg	1A	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	アバスチン注 （15mg/kg）	15mg/kg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 6	点滴注射		●
	パクリタキセル注 （175mg/m ² ）	175mg/m ²	
	生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射 7	点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=6）	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		