

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（テセントリク）		
注射 3	点滴注射		●
	テセントリク注 1200mg	1200mg	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） (1200mg/body)	250mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回60分、認容性良ければ2回目以降30分に短縮可		
注射 4	点滴注射		●
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		
注射 6	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		