

レジメン名称：A19-301 Atezo/CBDCA (5) /ETP (100) (d1-3) q3w 休業期間：21日

コメント：

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	<b>静脈内注射</b> 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ベーリンNaリソゲ用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	<b>点滴注射</b> 生食注(生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用(テセントリク)	1瓶	●		
注射 3	<b>点滴注射</b> テセントリク注 1200mg 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (1200mg/body) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 初回60分、忍容性よければ2回目以降30分に短縮可。	1200mg 250mL	●		
注射 4	<b>点滴注射</b> デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分	6.6mg 1袋	●		
注射 5	<b>点滴注射</b> カルボプラチン (AUC=5) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分	0mg/A 250mL	●		
注射 6	<b>点滴注射</b> エトポシド注 100mg/5mL 【IO白】 (100mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖注 500mL 点滴注射：1日1回 90分	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	●		
注射 7	<b>点滴注射</b> 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●		
注射 8	<b>静脈内注射</b> 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●		
注射 9	<b>点滴注射</b> デキサート注 3.3mg/1mL 生食注(生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 30分	6.6mg 100mL		●	●
注射 10	<b>点滴注射</b> エトポシド注 100mg/5mL 【IO白】 (100mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖注 500mL 点滴注射：1日1回 90分	100mg/m <sup>2</sup> 500mL		●	●
注射 11	<b>点滴注射</b> 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●	●
注射 12	<b>静脈内注射</b> 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		●	●