

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘリナロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘリナロック) ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射: 1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (テントリ)	1瓶	●		
注射 3	点滴注射 テセントリク注 1200mg 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (1200mg/body) 点滴注射: 1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。	1200mg 250mL	●		
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキソ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射: 1日1回 30分	6.6mg 1袋	●		
注射 5	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射: 1日1回 アテゾ投与前後フラッシュ用	1瓶	●		
注射 6	点滴注射 アテゾ注100mgインラインフィルター不可 【IO緑】 (100mg/m ²) 生理食塩液 PL 50mL (1m ² あたり20mLで溶解) 点滴注射: 1日1回 インラインフィルター不可 30分	100mg/m ² 50mL	●		
注射 7	点滴注射 カルボプラチン (AUC=6) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射: 1日1回 60分	0mg/A 250mL	●		
注射 8	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射: 1日1回 フラッシュ用 10分	1瓶	●		
注射 9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●		
注射 10	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射: 1日1回 30分	6.6mg 100mL		●	●
注射 11	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射: 1日1回 アテゾ投与前後フラッシュ用	1瓶		●	●
注射 12	点滴注射(化学A+無菌1) アテゾ注100mgインラインフィルター不可 【IO緑】 (100mg/m ²) 生理食塩液 PL 50mL (1m ² あたり20mLで溶解) 点滴注射: 1日1回 インラインフィルター不可 30分	100mg/m ² 50mL		●	●
注射 13	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		●	●