

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注(生理食塩液) 1000m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用(テセントリク)		
注射 3	点滴注射		●
	テセントリク注 1200mg	1200mg	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (1200mg/body)	250m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射 4	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴側管注		●
	アリムタ注射用	500mg / m <sup>2</sup>	
	生食注(生理食塩液) 1000m l (PG) (500mg/m <sup>2</sup> )	100m L	
	点滴注射：1日1回 10分で		
注射 6	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300m l	300m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 7	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (75mg/m <sup>2</sup> )	75mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 9	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 テセントリク終了後に開始 90分で		
注射 10	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 11	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 12	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		