

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100m l （P G）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保およびフラッシュ用（テセントリク）		
注射	3	点滴注射		●
		テセントリク注 1200mg	1200mg	
		生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ）	250m L	
		（1200mg/body）		
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射	4	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	5	点滴注射		●
		アリムタ注射用	500mg / m ²	
		（500mg/m ² ）		
		生食注（生理食塩液）100m l （P G）	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		10分で		
		アリムタ投与後、30分の経過観察不要		
注射	6	点滴注射		●
		カルボプラチン	0mg / A	
		（AUC=6）		
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
		アリムタ投与後、30分の経過観察不要		
注射	7	点滴注射		●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
		10分で		
注射	8	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		