

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 生食注（生理食塩液）1000mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用（キトルダ）	1瓶	●
注射 3	点滴注射 キートルダ注 （200mg/body） 生食注（生理食塩液）1000mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で	200mg 100mL	●
注射 4	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）1000mL（PG） 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	150mg 100mL	●
注射 5	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	9.9mg 1袋	●
注射 6	点滴側管注 マンニトールS注 300mL 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射 7	点滴側管注 シスプラチン注 （100mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	100mg/m ² 250mL	●
注射 8	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）	1瓶	●
注射 9	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 キートルダ終了後に開始 90分で	500mL	●
注射 10	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 11	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●
注射 13	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 4000mg/m ² / 20mL【赤 （4000mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）1000mL（PG） 点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製、4日間。	4000mg/m ² 1瓶	●