

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（パリンNa） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ルート確保及びフラッシュ用（キイトルーダ）	1瓶	●
注射 3	点滴注射 キイトルーダ注 （200mg/body） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で	200mg 100mL	●
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●
注射 5	点滴側管注 カルボプラチン （AUC=5） 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分で	0mg/A 250mL	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 7	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●
注射 8	点滴注射 5-FU注 1000mg/20mL 【IO赤】 （4000mg/m <sup>2</sup> ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製、4日間。	4000mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●