

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		●
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (セントリク)				
注射 3	点滴注射		●		●
	840mg テセントリク注	840mg			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (840mg/body)	250mL			
	点滴注射: 1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。				
注射 4	点滴注射		●		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射: 1日1回 30分で				
注射 5	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 アプタキザン投与前後フラッシュ用				
注射 6	点滴注射		●		
	アプタキザン注100mgインラインフィルタ不可 【IO緑 (100mg/m <sup>2</sup> )	100mg/m <sup>2</sup>			
	生理食塩液 PL 50mL (1mLあたり20mLで溶解)	50mL			
	点滴注射: 1日1回 インラインフィルター不可 30分で				
注射 7	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射 8	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射 9	点滴注射			●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射: 1日1回 30分で				
注射 10	点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 アプタキザン投与前後フラッシュ用				
注射 11	点滴注射			●	●
	アプタキザン注100mgインラインフィルタ不可 【IO緑 (100mg/m <sup>2</sup> )	100mg/m <sup>2</sup>			
	生理食塩液 PL 50mL (1mLあたり20mLで溶解)	50mL			
	点滴注射: 1日1回 インラインフィルター不可 30分で				
注射 12	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射 13	点滴注射				●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用 10分で				