

| 分類 | No. 薬剤/手技                           | 投与量   | day(1) |
|----|-------------------------------------|-------|--------|
| 注射 | 1 静脈内注射（リザーバーより）                    |       | ●      |
|    | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付              | 1筒    |        |
|    | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)  | 1筒    |        |
|    | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)           |       |        |
| 注射 | 2 点滴注射                              |       | ●      |
|    | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 1瓶    |        |
|    | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用         |       |        |
| 注射 | 3 点滴注射                              |       | ●      |
|    | キイトルーダ注<br>(200mg/body)             | 200mg |        |
|    | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 100mL |        |
|    | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>30分で |       |        |
| 注射 | 4 静脈内注射                             |       | ●      |
|    | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付              | 1筒    |        |
|    | ワンショット：1日1回<br>フラッシュ用<br>(不要の場合は削除) |       |        |