

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キトルダ）	1瓶	●		
注射 3	点滴注射 キイトルーダ注 (200mg/body) 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分	200mg 100mL	●		
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分 キイトルーダと別（フィルターなし）ルートで。	6.6mg 1袋	●		
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブプラキサン投与前後フラッシュ用	1瓶	●		
注射 6	点滴注射 アブプラキサン注 (100mg/m ²) 生理食塩液PL 50mL (1バールあたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分	100mg/m ² 50mL	●		
注射 7	点滴注射 カルボプラチン (AUC=6) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分	0mg/A 250mL	●		
注射 8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分	1瓶	●		
注射 9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●		
注射 10	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分	6.6mg 100mL		●	●
注射 11	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブプラキサン投与前後フラッシュ用	1瓶		●	●
注射 12	点滴注射 アブプラキサン注 (100mg/m ²) 生理食塩液PL 50mL (1バールあたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分	100mg/m ² 50mL		●	●
注射 13	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●	●