

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●	
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒							
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒							
		ワンショット：1日1回								
		不要の場合は削除可								
注射	2	点滴注射		●		●		●		
		デキサート注 3.3mg／1m l	10A							
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		30分で								
注射	3	点滴注射		●						
		カイプロリス注	20mg/g/m ²							
		（20mg/m2、最大44mg/B）								
		注射用蒸留水 100m l（PG）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		5%ブドウ糖注 50m l	50m L							
注射	4	点滴注射		●						
		生理食塩液PL 50m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用								
注射	5	静脈内注射		●						
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒							
		ワンショット：1日1回								
		不要の場合は削除可								
		フラッシュ用								
注射	6	点滴注射			●		●		●	
		デキサート注 3.3mg／1m l	1A							
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		30分で								
注射	7	点滴注射			●					
		カイプロリス注	20mg/g/m ²							
		（20mg/m2、最大44mg/B）								
		注射用蒸留水 100m l（PG）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		5%ブドウ糖注 50m l	50m L							
注射	8	点滴注射			●					
		生理食塩液PL 50m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用								
注射	9	静脈内注射			●					
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒							
		ワンショット：1日1回								
		不要の場合は削除可								
		フラッシュ用								
注射	10	点滴注射				●	●	●	●	
		カイプロリス注	27mg/g/m ²							
		27mg/m2、最大59.4mg/B								
		注射用蒸留水 100m l（PG）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		5%ブドウ糖注 50m l	50m L							
注射	11	点滴注射				●	●	●	●	
		生理食塩液PL 50m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用								
注射	12	静脈内注射				●	●	●	●	
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒							
		ワンショット：1日1回								
		不要の場合は削除可								
		フラッシュ用								
内服										
		レナリドミド	25mg/日 分1 食後		day(1)～(21)服用					
内服										
		レナデックス	40mg/日 分1-2 食後		day(22)服用					