

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	点滴注射		●
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A	
	生理食塩液 PL 50ml	50mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 2	点滴注射		●
	ガザイバ注 (1000mg/body)	1000mg	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (全量250mlに調製)	250mL	
	インラインフィルター使用 点滴注射：1日1回 初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ 100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30 分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。2サイクル以降、 最初の30分は30mL/h。その後225mL/hで投与可。 初回4.5h。2回目以降3.5h。2サイクル以降2h。		
注射 3	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50ml	50mL	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 4	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射 5	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		