

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射 2	点滴注射		●
	水溶性プレドニン注	100mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	アドセトリス注 (1.8mg/kg)	1.8mg/kg	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL	
	注射用蒸留水 100m l (PG) (1V/DW 10.5mlで溶解)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 30分で。		
注射 4	点滴注射		●
	アドリアシン注 (50mg/m <sup>2</sup> )	50mg/m <sup>2</sup>	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	エンドキサン注 (750mg/m <sup>2</sup> )	750mg/m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 6	持続点滴		●
	ソルデム3A注 500m l	500mL	
	★ 20m l メイロン84注	1A	
	持続点滴：1日1回 8-12時間		
注射 7	持続点滴		●
	ソルデム3A注 500m l	500mL	
	★ 20m l メイロン84注	1A	
	持続点滴：1日1回 8-12時間		
注射 8	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
内服			
	プレドニゾロン	100mg/日 分1-2 食後	day(2)~(5)服用