

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNa液100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック） ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2 点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg/1mL ボラミン注 5mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1A 1袋	●	
注射	3 点滴注射(リザーバーより) アービタックス注 (250mg/mL) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 60分で	250mg/mL 250mL	●	
注射	4 点滴注射（リザーバーより） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 15分で	1瓶	●	
注射	5 点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 (200mg/mL) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 120分で	200mg/mL 250mL	●	
注射	6 点滴注射(リザーバーより) エルブラット注 (85mg/mL) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で	85mg/mL 250mL	●	
注射	7 点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (400mg/mL) 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 4分で	400mg/mL 50mL	●	
注射	8 点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射	9 静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●	
注射	10 点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 (2400mg/mL) 生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量140mLに調製） 点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で	2400mg/mL 1瓶	●	
注射	11 点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg/1mL ボラミン注 5mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1A 100mL		●
注射	12 点滴注射(リザーバーより) アービタックス注 (250mg/mL) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 60分で	250mg/mL 250mL		●
注射	13 点滴注射（リザーバーより） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 15分で	1瓶		●
注射	14 静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒		●