

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘ ミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	6.6mg 100mL	●	
注射 3	点滴注射 ジェムザール注 (800mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30 分で	800mg / m <sup>2</sup> 100mL	●	
注射 4	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 10 分で フラッシュ用	50mL	●	
注射 5	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●	
注射 6	点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30 分で	6.6mg 1袋		●
注射 7	点滴注射 ドセタキセル注 (70mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 60 分で	70mg / m <sup>2</sup> 250mL		●
注射 8	点滴注射 ジェムザール注 (800mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30 分で	800mg / m <sup>2</sup> 100mL		●
注射 9	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 10 分で フラッシュ用	50mL		●
注射 10	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		●