

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回			
	リザーバーフラッシュ用			
	（不要の場合は削除）			
注射	2 点滴注射（リザーバーより）		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	ボララミン注 5mg/1mL	1A		
	アロキン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回			
	30分で			
注射	3 点滴注射(リザーバーより)		●	
	アーピタックス注	250mg/m ²		
	(250mg/m ²)			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回			
	60分で			
注射	4 点滴注射（リザーバーより）		●	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	15分で			
注射	5 点滴注射（リザーバーより）		●	
	レボホリナート注	200mg/m ²		
	(200mg/m ²)			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回			
	120分で			
注射	6 点滴注射(リザーバーより)		●	
	カンプト注	150mg/m ²		
	(150-180mg/m ²)			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回			
	レボホリナートと同時に側管から投与			
	90分で			
注射	7 点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	400mg/m ²		
	(400mg/m ²)			
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回			
	レボホリナート終了後全開			
	4分で			
注射	8 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	フラッシュ用			
注射	9 静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回			
	フラッシュ用			
	（不要の場合は削除）			
注射	10 点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	2400mg/m ²		
	(2400mg/m ²)			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
	（全量140mLに調製）			
	点滴注射：1日1回			
	type_T（青色タイプで持ち帰り）			
	46時間で			
注射	11 点滴注射（リザーバーより）			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	ボララミン注 5mg/1mL	1A		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回			
	30分で			
注射	12 点滴注射(リザーバーより)			●
	アーピタックス注	250mg/m ²		
	(250mg/m ²)			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回			
	60分で			
注射	13 点滴注射（リザーバーより）			●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	15分で			
注射	14 静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回			
	フラッシュ用			
	（不要の場合は削除）			