

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック） ワンショット：1日1回 不要の場合は削除可	1筒 1筒	●	●	●	●	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	5A 100mL	●	●	●	●	●	●
注射 3	点滴注射 カイプロリス注 56mg/m ² 、最大123mg/B 注射用蒸留水 100ml（PG） （カイプロリス溶解用） 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30分で	56mg / m ² 1瓶 100mL	●	●	●	●	●	●
注射 4	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	●	●	●	●	●
注射 5	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●	●	●	●	●
内服	レナデックス	20mg/日 分1-2 食後						day(22)(23)服用