

分類 No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1 静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒 1筒	●
注射 2 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●
注射 3 点滴注射 アバスチン注 （7.5mg/kg） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	7.5mg/kg 100mL	●
注射 4 点滴注射 カンプト注 （200mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	200mg/m ² 250mL	●
注射 5 点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 6 静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●
内服 カペシタビン	1600mg/m ² 分2 食後	day(1)～(14)服用