フラッシュ用

休薬期間:21日

分類 1	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈內注射		•	•	•
	生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL(ペミロック)	1筒			
	ワンショット:1日1回				
	(不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		•	•	
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6m g			
	ポララミン注 5mg/1ml	1 A			
	ガスター注 20mg	1 A			
	生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100 m L			
	点滴注射:1日1回				
	30 分で				
注射	3 点滴注射		•	•	
	パクリタキセル注	80 m g / m²			
	(80mg/m2)				
	生理食塩液注 250ml(ソフトバッグ)	250m L			
	点滴注射:1日1回				
	インラインフィルターを使用				
	60 分で				_
注射	4 点滴注射		•	•	
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶			
	点滴注射:1日1回				
	フラッシュ用				
	10 分で				
注射	5 静脈内注射		•	•	
	生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット: 1日1回				
	(不要の場合は削除)				