

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	2 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
	フラッシュ用		
注射	3 点滴注射		●
	ハイドロコートン注 100mg / 2m l	100mg	
	ポララミン注 5mg / 1m l	1A	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	リツキシマブBS注 (375mg/m ²)	375mg / m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500m l (1mg/mLになるように調製)	500m L	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (リツキシマブの希釈に使用)	1袋	
	点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
内服			
	レナリドミド	20mg/日 分1 食後	day(1)~(21)服用