

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●	●
注射 2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用	1瓶	●	●	●	●
注射 3	点滴注射 注射用メソトレキセート注 （20mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 3分	20mg/m ² 50mL	●	●	●	●
注射 4	点滴注射 オンコピン注 （1mg/m ² 、最大2mg/B） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 全開。	1mg/m ² 50mL	●			
注射 5	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●	●	●
内服	メルファラン	60mg/m ² 分1 食後		連日服用		
内服	プレドニゾロン	60mg/m ² 分1 食後		day(1)～(5)服用		