

レジメン名称：P16-202 PTX/CDDP triweekly（婦人科癌） 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNa付用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリン付)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		(ブライミング用)		
注射	3	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150mg	150mg	
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム3Aと同時に側管投与		
		30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
		ガスター注 20mg	1A	
		ボラミン注 5mg/1mL	1A	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		15分で		
注射	5	点滴側管注		●
		パクリタキセル注	175mg/m ²	
		(175mg/m ²)		
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		180分で		
注射	6	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	7	点滴側管注		●
		シスプラチン注	60mg/m ²	
		(60mg/m ²)		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60分で		
注射	8	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		(フラッシュ用)		
注射	9	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		2時間で		
注射	10	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		2時間で		
注射	11	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		90分で		
注射	12	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		フラッシュ用		
		(不要の場合は削除)		