

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg		
	アロキン注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	ナベルピン注 (20-25mg/m <sup>2</sup> )	25mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液 P L 50m l	50m L		
	点滴注射：1日1回 全開で			
注射 4	点滴注射		●	
	カルボプラチン (AUC= 4-6)	0mg /A		
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 5	点滴注射		●	
	生理食塩液 P L 50m l	50m L		
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回			
注射 6	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
	フラッシュ用			
注射 7	点滴注射			●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L		
	ルート確保用、フラッシュ用 点滴注射：1日1回			
注射 8	点滴注射			●
	ナベルピン注 (20-25mg/m <sup>2</sup> )	25mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液 P L 50m l	50m L		
	点滴注射：1日1回 全開で			
注射 9	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
	フラッシュ用			