

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg	
		アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3	点滴注射		●
		アバスチン注 (15mg/kg)	15 mg / kg	
		生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	100 mL	
		点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	4	点滴注射		●
		アリムタ注射用 (500mg/m ²)	500 mg / m ²	
		生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	100 mL	
		点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	5	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	100 mL	
		点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	6	点滴注射		●
		カルボプラチン (AUC=4-6)	0 mg / A	
		5%ブドウ糖注 250 mL	250 mL	
		点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	7	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50 mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	8	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		