

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック）	1筒		
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		アバスチン注 (10mg/kg)	10mg/kg		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4	点滴側管注		●	
		ドキシル注 (30mg/m ²)	30mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 250mL (90mg/B以上は500mL)	250mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 90分で			
注射	5	点滴注射		●	
		カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A		
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	6	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	7	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）			
注射	8	点滴注射			●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用			
注射	9	点滴注射			●
		アバスチン注 (10mg/kg)	10mg/kg		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	10	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）			