

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	ポララミン注 5 mg / 1 mL	1A	
	ガスター注 20 mg	1A	
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	16.5 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	アバスチン注 (15mg/kg)	15 mg / kg	
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	100 mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	パクリタキセル注 (175mg/m <sup>2</sup> )	175 mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 【生食】 500 mL	500 mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射 5	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0 mg / A	
	5%ブドウ糖注 250 mL	250 mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		