

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)
注射	1	点滴注射		●		●	●
		ボラミン注 5mg／1ml	1A				
		生理食塩液PL 50ml	50mL				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	2	点滴注射		●		●	●
		ガザイバ注 (1000mg/body)	1000mg				
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL				
		(全量250mlに調製)					
		インラインフィルター使用					
		点滴注射：1日1回					
		初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ					
		100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30					
		分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。					
		4.5h、2回目以降3.5h。					
注射	3	点滴注射		●			
		生理食塩液PL 50ml	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	4	持続点滴		●			
		ソルデム3A注 500ml	500mL				
		★ 20ml メイロン84注	1A				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	5	持続点滴		●			
		ソルデム3A注 500ml	500mL				
		★ 20ml メイロン84注	1A				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	6	点滴注射		●			
		アロキシ注バッグ 0.75mg／50mL	1袋				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	7	点滴注射		●			
		アドリアシン注 (50mg/m2)	50mg/m ²				
		生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	8	点滴注射		●			
		オンコビン注 (1.4mg/m2、最大2mg/B)	1.4mg/m ²				
		生理食塩液PL 50ml	50mL				
		点滴注射：1日1回					
		適宜。					
		全開。					
注射	9	点滴注射		●			
		エンドキサン注 (750mg/m2)	750mg/m ²				
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL				
		点滴注射：1日1回					
		90分で					
注射	10	点滴注射		●		●	●
		生理食塩液PL 50ml	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	11	持続点滴		●		●	●
		ソルデム3A注 500ml	500mL				
		★ 20ml メイロン84注	1A				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	12	持続点滴		●		●	●
		ソルデム3A注 500ml	500mL				
		★ 20ml メイロン84注	1A				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	13	静脈内注射		●		●	●
		生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
		フラッシュ用					
注射	14	静脈内注射		●		●	●
		生食注シリンジ 20mlロック付	1筒				
		ペリナNa ⁺ 用100単位/mLシリンジ 10mL(ペミロック)	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
内服							
		プレドニゾン	60mg/m ² 分1食後		day(1)～(5)服用		