

レジメン名称：G15-201 GEM（d1,8,15）/CBDCA（d1） monthly 休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg			
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		ジェムザール注	1000mg / m ²			
		(1000mg/m ²)				
		5%ブドウ糖注 100m l	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	4	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0mg / A			
		(AUC=5)				
		5%ブドウ糖注 250m l	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		60分で				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		フラッシュ用				
		点滴注射：1日1回				
		10分で				
注射	6	静脈内注射		●		
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		フラッシュ用				
		(不要の場合は削除)				
注射	7	点滴注射			●	●
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg			
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		ジェムザール注	1000mg / m ²			
		(1000mg/m ²)				
		5%ブドウ糖注 100m l	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		フラッシュ用				
		点滴注射：1日1回				
		10分で				
注射	10	静脈内注射			●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		フラッシュ用				
		(不要の場合は削除)				