

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg			
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●	●	●
	パクリタキセル注 (60mg/m ²)	60mg/m ²			
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 レボホリナートと同時に側管から投与 60分で				
注射 4	点滴注射		●	●	●
	レボホリナート注 (250mg/m ²)	250mg/m ²			
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 パクリタキセルと同時に側管から投与 120分で				
注射 5	点滴注射		●	●	●
	5-FU注 (500mg/m ²)	500mg/m ²			
	生理食塩液PL 50ml	50mL			
	点滴注射：1日1回 レボホリナート投与開始、1時間後に投与 4分で				
注射 6	点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 5-FUフラッシュ用 10分で				