

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	●
	デキサート注 3. 3mg / 1ml	10A		
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A		
	ガスター注 20mg	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴注射		●	●
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分以上かけて			
注射	4 点滴注射		●	●
	サークリサ注 (20mg/kg)	20mg/kg		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 【全量250mLに調製】	250mL		
	点滴注射：1日1回 初回：最初60分；25mL/h。 次30分；30mL/h、次30分；40mL/h、 次30分；45mL/h、以降；55ml/hまで。 2回目以降、最初60分；25mL/h 次30分；40mL/h、以降；55ml/hまで。 インラインフィルター使用			
注射	5 点滴注射		●	●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	6 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
内服				
	レナデックス	40mg/日 分1 食後		day(8)(22)服用