

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒						
	ヘパリンNaが用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリン)	1筒						
	ワンショット：1日1回							
注射 2	点滴注射		●				●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	5A						
	ポララミン注 5mg/1mL	1A						
	ガスター注 20mg/2mL	1A						
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 3	点滴注射		●				●	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	30分以上かけて							
注射 4	点滴注射		●				●	
	サークリサ注 (10mg/kg)	10mg/kg						
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 【全量250mLに調製】	250mL						
	点滴注射：1日1回							
	初回：最初60分；40mL/h。							
	以降、30分毎に10mL/hずつ上げ90mL/hまで。							
	2回目以降：最初60分；40mL/h。							
	次30分；60mL/h、次30分；90mL/h、以降；100mL/hまで							
	インラインフィルターを使用。							
注射 5	点滴注射		●				●	
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	サークリサフラッシュ用							
注射 6	点滴注射		●					
	カイプロリス注 (56mg/mL)	56mg/mL						
	注射用蒸留水 100mL (PG)	1瓶						
	(カイプロリス溶解用)							
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 7	点滴注射		●					
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	カイプロリスフラッシュ用							
注射 8	点滴注射			●	●	●		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	5A						
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 9	点滴注射			●	●	●	●	●
	カイプロリス注 (56mg/mL)	56mg/mL						
	注射用蒸留水 100mL (PG)	1瓶						
	(カイプロリス溶解用)							
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 10	点滴注射			●	●	●	●	●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	カイプロリスフラッシュ用							
内服								
	レナデックス	20mg/日 分1 食後					day(22)(23)服用	