

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)
注射 1	点滴注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ペリナゾック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペリナゾック)	1筒			
	点滴注射：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		●
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6g			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	エトボシド注 (100mg/m ²)	100mg/g/m ²			
	5%ブドウ糖注 500ml	500mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 4	点滴注射		●		
	【要時】コスメゲン注 (500μg/B)	500μg			
	注射用水 20mL (1VあたりDW1.1mLで溶解)	1.1mL			
	生理食塩液PL 50ml	50mL			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 5	点滴注射		●		
	メントレキセート点滴静注液 (300mg/m ²)	300mg/g/m ²			
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL			
	点滴注射：1日1回 12時間で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 7	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				
注射 8	点滴注射			●	
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6g			
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 9	点滴注射			●	
	エトボシド注 (100mg/m ²)	100mg/g/m ²			
	5%ブドウ糖注 500ml	500mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 10	点滴注射			●	
	【要時】コスメゲン注 (500μg/B)	500μg			
	注射用水 20mL (1VあたりDW1.1mLで溶解)	1.1mL			
	生理食塩液PL 50ml	50mL			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 11	点滴注射			●	
	生理食塩液PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 12	静脈内注射			●	
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				
注射 13	点滴注射				●
	オンコピン注 (0.8~1.0mg/m ²)	1mg/g/m ²			
	生理食塩液PL 50ml	50mL			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 14	点滴注射				●
	エンドキサン注 (600mg/m ²)	600mg/g/m ²			
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 15	点滴注射				●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 16	静脈内注射				●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				