

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 注射 1 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴注射 | | ● |
| | デキサート注 3. 3mg / 1ml | 6.6mg | |
| | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL | 1袋 | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 3 | 点滴注射 | | ● |
| | エルプラット注 (130mg/m ²) | 130mg / m ² | |
| | 5%ブドウ糖注 250m l | 250m L | |
| | 点滴注射：1日1回 120分で | | |
| 注射 4 | 点滴注射 | | ● |
| | 生理食塩液 P L 50m l | 50m L | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 | | |
| 注射 5 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| | フラッシュ用 | | |
| 内服 | | | |
| | カベシタビン | 2000mg/m ² 分2 食後 | day(1)~(14)服用 |