

レジメン名称：D15-101 DTIC（250mg/m²）（d1-5） monthly 休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●	●	●
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg / 1m l アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●				
注射	3	点滴注射 ダカルバジン注 【遮光】 （250mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	250mg / m ² 250m L	●				
注射	4	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	50m L	●				
注射	5	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●				
注射	6	点滴注射 デキサート注 3.3mg / 1m l 生食注（生理食塩液）100m l （P G） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100m L		●	●	●	●
注射	7	点滴注射 ダカルバジン注 【遮光】 （250mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	250mg / m ² 250m L		●	●	●	●
注射	8	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	50m L		●	●	●	●
注射	9	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●	●	●	●