

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	パブリックNa ⁺ 用100単位/mLシリンジ 10mL(パブリック)	1筒		
	ワンショット: 1日1回			
	リザーバーフラッシュ用			
	(不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射 (リザーバーより)		●	
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg		
	ボラミン注 5mg/1ml	1A		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射: 1日1回			
	30分			
注射	3 点滴注射		●	
	アービタックス注	400mg/m ²		
	(初回のみ400mg/m ²)			
	生理食塩液注【生食】 500m l	500mL		
	点滴注射: 1日1回			
	初回: 120分			
注射	4 点滴注射 (リザーバーより)		●	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
	点滴注射: 1日1回			
	15分			
注射	5 点滴注射 (リザーバーより)		●	
	レボホリナート注	200mg/m ²		
	(200mg/m ²)			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射: 1日1回			
	120分			
注射	6 点滴注射(リザーバーより)		●	
	エルブラット注	85mg/m ²		
	(85mg/m ²)			
	5%ブドウ糖注 250m l	250mL		
	点滴注射: 1日1回			
	レボホリナートと同時に側管から投与			
	120分			
注射	7 点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	400mg/m ²		
	(400mg/m ²)			
	生理食塩液PL 50m l	50mL		
	点滴注射: 1日1回			
	4分			
注射	8 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射: 1日1回			
	フラッシュ用			
注射	9 静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット: 1日1回			
	フラッシュ用			
	(不要の場合は削除)			
注射	10 点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	2400mg/m ²		
	(2400mg/m ²)			
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
	(全量140m l に調製)			
	点滴注射: 1日1回			
	type_T (青色タイプで持ち帰り)			
	46時間で			
注射	11 点滴注射 (リザーバーより)			●
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg		
	ボラミン注 5mg/1ml	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100mL		
	点滴注射: 1日1回			
	30分			
注射	12 点滴注射			●
	アービタックス注	250mg/m ²		
	(250mg/m ²)			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射: 1日1回			
	60分			
注射	13 点滴注射 (リザーバーより)			●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
	点滴注射: 1日1回			
	15分			
注射	14 静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット: 1日1回			
	フラッシュ用			
	(不要の場合は削除)			