	ン名称: E15-402 mitotane daily / EDP monthly	休楽期間:28日				
	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
È射	 静脈内注射(リザーバーより) 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 	1節	•	•	•	•
	生資注シリンシ 2 Um 「【安時】ロックトリ ヘバリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL(ベミロック)	1筒				
	ワンショット:1日1回	2 (10)				
	(不要の場合は削除)					
注射	2 点滴注射		•			
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6m g				
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋				
	点滴注射:1日1回					
	30 分で					
注射	3 点滴注射		•			
	アドリアシン注	40 m g / m²				
	(40mg/m2)					
	生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100m L				
	点滴注射:1日1回 30 分で					
注射	4 点滴注射		•			
m-91	生理食塩液PL 50ml	1瓶				
	点滴注射:1日1回					
	10 分で					
	フラッシュ用					
注射	5 静脈内注射		•			
	生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1前				
	ワンショット: 1日1回					
	(不要の場合は削除)					
	フラッシュ用			_		
主射	6 点滴側管注			•		
	デキサート注 3.3 mg/1ml	6.6 m g 100 m L				
	生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回	100m L				
	30 分で					
神針	7 点滴注射			•		
	エトポシド注	100m g/mi				
	(100mg/m2)	0.				
	5%プドウ糖注 500ml	500m L				
	点滴注射:1日1回					
	90 分で					
注射	8 点滴注射			•		
	生理食塩液 P L 50 m I	1瓶				
	点滴注射:1日1回					
	10 分で					
	フラッシュ用			•		
注射	9 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1%		•		
	生資注シリンシ 2 U m l 【安時】 ロックト ワンショット: 1日1回	1(0)				
	(不要の場合は削除)					
	フラッシュ用					
主射	10 点滴注射				•	
	ソルデム3A注 500ml	500m L				
	点滴注射:1日1回					
	メイン					
	3 時間で					
÷ 6+	11 点滴注射				•	•
CE 253		500m L				
T-83	ヴィーン 3 G注 5 0 0 m L	5001112				
E-973	点滴注射:1日1回	555111 2				
E-973		3001112				

		点滴注射:1日1回		
		10 分で		
		フラッシュ用		
注射	9	静脈内注射	•	
		生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット: 1日1回		
		(不要の場合は削除)		
		フラッシュ用		
注射	10	点滴注射	•	

10	点滴注射	•
	ソルデム 3 A注 5 0 0 m l	500 m L
	点滴注射:1日1回	
	メイン	
	3 時間で	
11	点滴注射	• •
	ヴィーン 3 G注 5 0 0 m L	500m L
	点滴注射:1日1回	
	メイン	
	90 分で	

		90 分で	
注射	12	点滴側管注	•
		プロイメンド注 150mg	150m g
		生食注(生理食塩液) 100 m l (PG)	100 m L
		点滴注射:1日1回	
		30 分で	
注射	13	点滴側管注	• •
		デキサート注 3.3 mg/1 m l	6.6m g
		生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100 m L
		点滴注射:1日1回	
		30 分で	
注射	14	点滴側管注	•
		エトポシド注	100m g/m²

		エトポシド注 (100mg/m2)	100m g/m
		5%プドウ糖注 500ml	500 m L
		点滴注射:1日1回	
		90 分で	
注射	15	点滴例管注	•
		マンニットールS注 300mL/袋	300m L
		点滴注射:1日1回	
		メイン	
		30 分で	
注射	16	点滴例管注	•
		シスプラチン注	40 m g / m²
		(40mg/m2)	
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250 m L

注射	16	点滴側管注	•
		シスプラチン注	40 m g / m²
		(40mg/m2)	
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250 m L
		点滴注射:1日1回	
		60 分で	
注射	17	点滴側管注	•
		生理食塩液 P L 5 0 m I	1瓶
		点滴注射:1日1回	
		10 />-5	

	10 分で		
	フラッシュ用		
注射:	18 静脈內注射		•
	生食注シリンジ 20ml【要時】ロ	1ック付 1筒	
	ワンショット: 1日1回		
	(不要の場合は削除)		
	フラッシュ用		
注射 :	19 点滴側管注		•
	- 1 48 t 1 1 NA	100	

VERS 13	無凋肉皆江	
	エトポシド注	100m g/m²
	(100mg/m2)	
	5%プドウ糖注 500ml	500m L
	点滴注射:1日1回	
	90 分で	
注射 20	点滴側管注	•
	マンニットールS注 300mL/袋	300 m L

	点滴注射:1日1回	
	メイン	
	30 分で	
注射 21	点滴例管注	•
	シスプラチン注	40 m g / m²
	(40mg/m2)	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250 m L
	去海注射·101回	

			(4011g/ 1112)		
			生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250m L	
			点滴注射:1日1回		
			60 分で		
注	注射	22	点滴注射		•
			ヴィーン 3 G注 5 0 0 m L	500m L	
			点滴注射:1日1回		
			メイン		
			1500-5		

		150分で		
注射	23	点滴側管注		•
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶	
		点滴注射:1日1回		
		10 分で		
		フラッシュ用		
注射	24	静脈内注射		•
		生食注シリンジ 20ml 【更味】ロッカ付	1節	

(土物 (全 静原内温射 生食注シリンジ 20ml [要時] ロック付 ワンショット:1日1回 (不要の場合は制除) フラッシュ用 内服