レジメン名称：D21-203 DKdsc療法 サイクル2　　休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)
注射	2	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●	
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒							
		ワンショット：１日１回								
		不要の場合は削除可								
注射	3	点滴注射		●	●	●	●	●	●	
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	6A							
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30　分で								
注射	4	点滴注射		●	●	●	●	●	●	
		カイプロリス注	56ｍｇ/㎡							
		（56mg/㎡）								
		★全量250mLに調製★								
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		（カイプロリス溶解用）								
		５％ブドウ糖注　２５０ｍｌ	250ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30　分で								
注射	5	点滴注射		●	●	●	●	●	●	
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		フラッシュ用								
注射	6	皮下注射		●		●		●		
		ダラキューロ配合皮下注	1800ｍｇ							
		（1800mg/body）								
		ワンショット：１日１回								
		時計回りに腹部皮下組織に投与								
		3～5分で								
		（カイプロリス投与後）								
注射	7	皮下注射								●
		ダラキューロ配合皮下注	1800ｍｇ							
		（1800mg/body）								
		ワンショット：１日１回								
		時計回りに腹部皮下組織に投与								
		3～5分で								
内服										
		レナデックス	40mg/日		day(22)服用					
			分1　食後							