

| 分類 | No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|----|-----|---|------------------------------|--------|
| 注射 | 1 | 静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へパミロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） | 1筒 1筒 | ● |
| 注射 | 2 | 点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で | 6.6mg 100mL | ● |
| 注射 | 3 | 点滴注射 パージェタ注 （初回のみ840mg/body） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：60分。 | 840mg 250mL | ● |
| 注射 | 4 | 点滴注射 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で | 1瓶 | ● |
| 注射 | 5 | 点滴注射 トラスツズマブBS注 （初回のみ8mg/kg） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分。 | 8mg/kg 250mL | ● |
| 注射 | 6 | 点滴注射 ドセタキセル注 （75mg/m ² ） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 60分で | 75mg/m ² 250mL | ● |
| 注射 | 7 | 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で | 1瓶 | ● |
| 注射 | 8 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用 | 1筒 | ● |