

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
	ヘパリンNa液用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリン)	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	不要の場合は削除可							
注射 2	点滴注射		●	●			●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	10A						
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 3	点滴注射		●					
	カイプロリス注	27mg/m ²						
	27mg/m ² 、最大59.4mg/B							
	注射用蒸留水 100mL（PG）	1瓶						
	（カイプロリス溶解用）							
	5%ブドウ糖注 50mL	50mL						
	点滴注射：1日1回							
	10分で							
注射 4	点滴注射		●					
	生理食塩液PL 50mL	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	フラッシュ用							
注射 5	静脈内注射		●					
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	（不要の場合は削除）							
	フラッシュ用							
注射 6	点滴注射			●		●		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	ルート確保およびフラッシュ用							
注射 7	点滴注射			●	●	●	●	
	カイプロリス注	27mg/m ²						
	27mg/m ² 、最大59.4mg/B							
	注射用蒸留水 100mL（PG）	1瓶						
	（カイプロリス溶解用）							
	5%ブドウ糖注 50mL	50mL						
	点滴注射：1日1回							
	10分で							
注射 8	静脈内注射			●	●	●		
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	（不要の場合は削除）							
	フラッシュ用							
注射 9	点滴注射				●		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	フラッシュ用							
注射 10	静脈内注射						●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	（不要の場合は削除）							
	フラッシュ用							
注射 11	点滴注射							●
	カイプロリス注	27mg/m ²						
	27mg/m ² 、最大59.4mg/B							
	注射用蒸留水 100mL（PG）	1瓶						
	（カイプロリス溶解用）							
	5%ブドウ糖注 50mL	50mL						
	点滴注射：1日1回							
	10分で							
内服								
	レナリドミド	25mg/日						
	分1食後							
内服								
	レナデックス	40mg/日						
	分1-2食後							