

レジメン名称：N20-101 Nivo(480mg,Nivo/Ipi維持q4w,MSI-H結腸・直腸 休薬期間：28日

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|---|-------|--------|
| 注射 1 | 静脈内注射（リザーバーより） | | ● |
| | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴注射 | | ● |
| | 生食注（生理食塩液）100mL（PG） | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 | | |
| 注射 3 | 点滴注射 | | ● |
| | オプジーボ注 (480mg/Body) | 480mg | |
| | 生理食塩液 PL 50mL | 50mL | |
| | 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分以上かけて | | |
| 注射 4 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | | |