

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3. 3 mg / 1 mL	6.6 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30 分で		
注射 3	点滴注射		●
	5-FU注	600mg/m ²	
	(600mg/m ²)		
	生理食塩液 PL 50 mL	50m L	
	点滴注射：1日1回		
	15 分で		
注射 4	点滴注射		●
	メソトレキセート注	40mg/m ²	
	(40mg/m ²)		
	生理食塩液 PL 50 mL	50m L	
	点滴注射：1日1回		
	15 分で		
注射 5	点滴注射		●
	エンドキサン注	600mg/m ²	
	(600mg/m ²)		
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	100m L	
	点滴注射：1日1回		
	15 分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 mL	50m L	
	点滴注射：1日1回		
	10 分で		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	フラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		